$y'(x) = A \cdot y(x) + g(x)$ $\quad (y' = p(x)y + g(x))$

хомогена част | нехомогена част

ОР: $y(x) = y_H(x) + y_p(x)$

ОР хомогено | ПР нехомогено

(*) $g(x) = P_s[x] \cdot e^{\mu x}$, $\mu \in \mathbb{R}$

$s \in \mathbb{N}_0$, $s = st(P_s[x]) = \deg(P_s[x])$

} трябва у общия $\rightarrow$ $y_p(x) = Q_{m+s}[x]\, e^{\mu x}$

m = вишеструкост броя μ като решение характеристичне уне A

① а) $y_1' = 2y_1 + y_2 + xe^x$

$y_2' = -y_1 + 2y_2 - e^x$

$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ $\qquad y' = Ay + g$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

$g(x) = \begin{bmatrix} xe^x \\ -e^x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -1 \end{bmatrix} \cdot e^x$

ХОМОГЕНА: $y' = Ay$

$\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 2 \pm i$

$\lambda_1 = 2+i \rightsquigarrow (A - \lambda_1 E)\gamma_1 = 0 \rightsquigarrow \gamma_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$

$\psi(x) = e^{\lambda_1 x}\gamma_1 = e^{2x} \cdot \begin{bmatrix} \cos x + i \sin x \\ i\cos x - \sin x \end{bmatrix}$ $\rightsquigarrow$ Re, $\rightsquigarrow$ Im

ОРХ: $y_H(x) = C_1 e^{2x} \begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix} + C_2 e^{2x} \begin{bmatrix} \sin x \\ \cos x \end{bmatrix}$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

НЕХОМОГЕНА

$g(x) = \begin{bmatrix} x \\ -1 \end{bmatrix} e^{x} = P_s[x]\, e^{\mu x}$

$\mu = 1$, $s = 1$ $\rightsquigarrow$ μ няма сред с-ст. A $\Rightarrow m = 0$

$\lambda_{1/2} = 2 \pm i$

$$y_p(x) = Q_{0+1}[x]\, e^{1x} = Q_1[x]\cdot e^x = \begin{bmatrix} a_1x+b_1 \\ a_2x+b_2 \end{bmatrix} e^x \rightsquigarrow y_p' = Ay_p + g$$

$$\begin{bmatrix} a_1x+b_1+a_1 \\ a_2x+b_2+a_2 \end{bmatrix}\cdot e^x = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1x+b_1 \\ a_2x+b_2 \end{bmatrix} e^x + \begin{bmatrix} x \\ -1 \end{bmatrix}\cdot e^x$$

$$\left.\begin{aligned} a_1x+b_1+a_1 &= 2a_1x+2b_1+a_2x+b_2+x \\ a_2x+b_2+a_2 &= -a_1x-b_1+2a_2x+2b_2-1 \end{aligned}\right\} \forall x \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} a_1 &= 2a_1+a_2+1 \quad \Rightarrow a_1 = a_2 = -\tfrac{1}{2} \\ b_1+a_1 &= 2b_1+b_2 \\ a_2 &= -a_1+2a_2 \rightsquigarrow a_2 = a_1 \\ b_2+a_2 &= -b_1+2b_2-1 \end{aligned}$$

$$\left.\begin{aligned} -\tfrac{1}{2} &= b_1+b_2 \\ \tfrac{1}{2} &= -b_1+b_2 \end{aligned}\right\} b_2 = 0,\ b_1 = -\tfrac{1}{2}$$

$$y_p(x) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}x-\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}x \end{bmatrix}\cdot e^x$$

ОР: $y(x) = y_H(x) + y_p(x)$

б) $y_1' = 2y_1+y_2+2e^x$

$y_2' = y_1+2y_2-3e^{4x}$

$y' = Ay+g$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $g(x) = \begin{bmatrix} 2e^x \\ -3e^{4x} \end{bmatrix}$

ХОМ: $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3$

$\gamma_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\quad \gamma_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\varphi_1(x) = e^x\cdot\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\quad \varphi_2(x) = e^{3x}\cdot\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

НЕХОМ: $g(x) = \begin{bmatrix} 2e^x \\ -3e^{4x} \end{bmatrix} \neq P_s[x]\, e^{mx}$

$$g(x) = g_1(x) + g_2(x)$$

$$g_1(x) = \begin{bmatrix} 2e^x \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g_2(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ -3e^{4x} \end{bmatrix} \Bigg\} \; y_P(x) = y_{P_1}(x) + y_{P_2}(x)$$

$y_{P_1}(x)$ $\qquad$ $y_{P_2}(x)$

$g_1(x)$: $\quad g_1(x) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot e^x = P_s[x]\, e^{\mu x}$

$\mu = 1$, $s = 0$ $\rightsquigarrow$ $\mu = 1$ $\Rightarrow y_{P_1}(x) = Q_1[x] \cdot e^x = \begin{bmatrix} a_1 x + b_1 \\ a_2 x + b_2 \end{bmatrix} e^x$

$\lambda = 1$, $s + m = 1$

$y_{P_1}' = A y_{P_1} + g_1(x)$

$y_{P_1}(x) = \begin{bmatrix} x-1 \\ -x \end{bmatrix} \cdot e^x$ — частно.

$g_2(x)$: $\quad g_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} \cdot e^{4x} \Rightarrow s = 0$, $\mu = 4 \rightsquigarrow m = 0$ $\Rightarrow y_{P_2}(x) = Q_0[x]\, e^{4x} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} e^{4x}$

$y_{P_2}' = A y_{P_2} + g_2(x)$

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \cdot 4e^x = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \cdot e^{4x} + \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} \cdot e^{4x}$$

$$\left.\begin{aligned} 4a &= 2a + b \\ 4b &= a + 2b - 3 \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} a &= -1 \\ b &= -2 \end{aligned}$$

$$y_{P_2}(x) = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot e^{4x}$$

$$\text{ОР: } y(x) = c_1 \cdot \begin{bmatrix} e^x \\ -e^x \end{bmatrix} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} e^{3x} \\ e^{3x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x-1 \\ -x \end{bmatrix} \cdot e^x + \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot e^{4x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$y' = A(x)\, y$ — не мора одавно да буде са кк

ОР: $y(x) = \Phi(x) \cdot C$, $C \in \mathbb{R}^n$

$\Phi(x) = [\varphi_1 \downarrow \; \cdots \; \varphi_n \downarrow]$

$y' = A(x) \cdot y + g(x)$

$\Phi(x)$ – фунд. матр. хомогеног система $y' = A(x)\, y$

ОР: $y(x) = \Phi(x) \left(C + \int \Phi^{-1}(x) \cdot g(x)\, dx \right) = \Phi(x) \cdot C + \Phi(x) \int \Phi^{-1}(x)\, g(x)\, dx$

$\Phi(x)$ – фунд. матр. [illegible]

ОР: $y(x) = \Phi(x)\left(C + \int \Phi^{-1}(x)\cdot g(x)\,dx\right) = \underbrace{\Phi(x)\cdot C}_{\text{ОРХ}} + \underbrace{\Phi(x)\int \Phi^{-1}(x)\,g(x)\,dx}_{y_p(x)\text{ од нехомогене}}$

Извођење: хомогена има ОР $\cdot\ X(t) = \Phi(t)\,c,\ c\in\mathbb{R}^n$

варијација константе: $c \rightsquigarrow c(t)$

$$X(t) = \Phi(t)\,c(t)$$

$$X'(t) = \Phi'(t)\cdot c(t) + \Phi(t)\,c'(t)$$

$X'(t) = A(t)\,X(t) + g(t) \Rightarrow \underbrace{\Phi'(t)}_{\Phi'=A\Phi}\,c(t) + \Phi(t)\,c'(t) = A(t)\,(\Phi(t)\cdot c(t)) + g(t)$

$$\Rightarrow \quad \underbrace{A(t)\,\Phi(t)}\cdot c(t) + \Phi(t)\,c'(t) = \underbrace{A(t)\,\Phi(t)}\cdot c(t) + g(t)$$

$W(t)\neq 0 \Rightarrow \Phi(t)$ инвертибилно

$\Phi^{-1}(t)\cdot$ $\Phi(t)\cdot c'(t) = g(t)$

$$c'(t) = \Phi^{-1}(t)\cdot g(t)$$

$$c(t) = \int \Phi^{-1}(t)\,g(t)\,dt + C$$

→ ово је интеграл по компонентама

$$X(t) = \Phi(t)\,c(t) = \Phi(t)\left(C + \int \Phi^{-1}(t)\,g(t)\,dt\right) =$$

$$= \boxed{\Phi(t)\,C} + \boxed{\Phi(t)\cdot\int \Phi^{-1}(t)\,g(t)\,dt}$$

општа реш хомогене — партикуларно решење нехомогене

② $y_1' = y_2 + \operatorname{tg}^2 x + 1$

$y_2' = -y_1 + \operatorname{tg} x$

$y' = Ay + g(x)$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix},\ g(x) = \begin{bmatrix} \operatorname{tg}^2 x + 1 \\ \operatorname{tg} x \end{bmatrix}$? ✗ $\neq P_s[x]\,e^{\mu x}$

$\Phi(x) = ?$

$\left.\begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= -y_1 \end{aligned}\right\}\ y_1'' = y_2' = -y_1 \Rightarrow y_1'' + y_1 = 0 \rightsquigarrow y_1(x) = c_1\cos x + c_2\sin x$

$y_2(x) = -c_1\sin x + c_2\cos x$

$\begin{bmatrix} u_1(x) & \cos x & \sin x \end{bmatrix}$

$y_2' = -y_1 \int$ [illegible]

$y_2(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x$

$$y(x) = \begin{bmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{bmatrix} = C_1 \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix}}_{\varphi_1(x)} + C_2 \underbrace{\begin{bmatrix} \sin x \\ \cos x \end{bmatrix}}_{\varphi_2(x)}$$

$$\Phi(x) = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$$

($\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$)

$$W(x) = \det \Phi(x) = \cos^2 x - (-\sin^2 x) = 1 \neq 0$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightsquigarrow A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \Rightarrow \Phi^{-1}(x) = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{bmatrix}$$

$$\int \Phi^{-1}(x)\, g(x)\, dx = \int \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \operatorname{tg}^2 x + 1 \\ \operatorname{tg} x \end{bmatrix} dx = \int \begin{bmatrix} -\frac{\sin^3 x}{\cos x} + \cos x - \frac{\sin^2 x}{\cos x} \\ \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} + \sin x + \sin x \end{bmatrix} dx =$$

Integrate term by term

$$= \int \begin{bmatrix} \cos x \\ \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} + 2\sin x \end{bmatrix} dx = \begin{bmatrix} \int \cos x\, dx \\ \int \left(\frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} + 2\sin x \right) dx \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin x \\ \cos x + \frac{1}{\cos x} - 1\cos x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin x \\ -\cos x + \frac{1}{\cos x} \end{bmatrix}$$

$$\int \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x}\, dx = \int \frac{(1-\cos^2 x)\sin x\, dx}{\cos^2 x} = \int \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x} (-\sin x)\, dx = \int \frac{t^2-1}{t^2}\, dt = t - \int \frac{dt}{t^2} =$$

$\cos x = t$

$dt = (-\sin x)\, dx$

$$= t - \left(-\frac{1}{t}\right) = t + \frac{1}{t} = \cos x + \frac{1}{\cos x}$$

$$y_p(x) = \Phi(x) \int \Phi^{-1}(x) g(x)\, dx = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin x \\ -\cos x + \frac{1}{\cos x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sin x \cos x}{x} - \frac{\sin x \cos x}{x} + \frac{\sin x}{\cos x} \\ \underbrace{-\sin^2 x - \cos^2 x}_{-1 x} + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{tg} x \\ 0 \end{bmatrix}$$

OP: $y(x) = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \operatorname{tg} x \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$